

Проста-ЛІК SR (Prosta-LIQ SR)

Медичний виріб 

 <10
ректальні
супозиторії

ІНСТРУКЦІЯ для застосування медичного виробу

Склад:

діючі речовини:

1 супозиторій містить лактоферину 30 мг, гліцерофосфоінозитулу 40 мг, гіалуронової кислоти 20 мг;

допоміжні речовини: кремнію діоксид колоїдний, твердий жир.

Форма випуску: супозиторії ректальні по 2 г

Ректальні супозиторії Проста-ЛІК SR застосовуються як допоміжний засіб при місцевому лікуванні сечостатевої та аноректальної захворювань які супроводжуються болем. Завдяки місцевій захисній і змащувальній дії, супозиторії Проста-ЛІК SR мають сприятливий вплив як при гострих, так і хронічних захворюваннях передміхурової залози, в тому числі простатиті, полегшуючи больові симптоми.

Спосіб застосування.

Застосовувати ректально після випорожнення кишечника, супозиторій вводити глибоко у задній прохід. Рекомендується один супозиторій на день, бажано ввечері перед сном.

Не перевищувати рекомендовану дозу.

Протипоказання.

Не використовувати дітям у віці до 12 років.

Застосування Проста-ЛІК SR не рекомендується у разі відомої гіперчутливості до будь-якого з компонентів;

Не використовувати у разі:

- гострий біль у животі або біль неясного походження;
- нудота або блювання;
- кишкова непрохідність або стеноз;
- ректальна кровотеча неясного походження;
- гострий гемороїдальний криз з болем і кровотечею;
- сильне зневоднення.

Люди похилого віку або люди зі слабким здоров'ям у будь-якому випадку повинні проконсультуватися з лікарем перед використанням Проста-ЛІК SR.

Особливості застосування.

Кожен супозиторій призначений тільки для одноразового використання і повинен бути вилучений з упаковки лише безпосередньо перед використанням: не використовуйте супозиторії, які були зламані або видалені з блистерної упаковки у невідомий час, оскільки це може призвести до ризику забруднення супозиторію; не намагайтеся повторно використовувати супозиторії, які випадково витікали після першої спроби.

Нерівномірний темний колір, який може мати супозиторій, є ознакою зниження ефективності або поганого зберігання супозиторію;

Проста-ЛІК SR не є стерильним, однак, не рекомендується використовувати супозиторії при пошкодженні первинної упаковки (блистера).

Побічні реакції.

Немає відомих короткострокових або середньо / довгострокових побічних ефектів. Проста-ЛІК SR не впливає на сенсорні здібності (рівень уваги, здатність керувати автомобілем або виконувати будь-які дії). Однак у разі виникнення побічних ефектів, таких як надмірне подразнення, біль або дискомфорт, які можуть виникнути внаслідок використання медичного виробу, негайно припиніть лікування та зверніться до лікаря.

Взаємодія з іншими препаратами або медичними виробами.

Супозиторії Проста-ЛІК SR можуть скоротити час перебування в кишечнику, а отже, і всмоктування інших лікарських засобів, які одночасно приймаються перорально. Тому після перорального прийому препарату рекомендується витримати принаймні 2 години перед застосуванням

Проста-ЛІК SR. У будь-якому випадку уникайте, наскільки це можливо, застосування Проста-ЛІК SR під час використання інших медичних виробів або лікарських засобів. У будь-якому випадку проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж застосовувати Проста-ЛІК SR, якщо ви пройшли будь-яку медикаментозну терапію.

Строк придатності: 30 місяців.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці. Не застосовувати при порушенні упаковки.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі до 25°C в сухому, захищеному від дії сонячного світла місці. Витягувати супозиторій тільки безпосередньо перед застосуванням. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 5 супозиторіїв у блистері. По 2 блистери в картонній коробці.

 **Виробник:** Фултон Медіцинали С.п.А., Віа Гульєльмо Марконі, 28/9 20044 Аресе, Італія /Fulton Medicinali S.p.A. Via Guglielmo Marconi 28/9 20044 Arese, Italy.

За ліцензією Веліт Біофарма Срл., площа Кавур 3, 20121, Мілан, Італія/ under license of Velit Biopharma Srl, Piazza Cavour 3, 20121, Milan, Italy.

Уповноважений представник в Україні: ТОВ «Клімед Україна», Україна, 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 40у. тел.+38 044 228 47 17, <http://kleemed.com.ua>

Дата останнього перегляду інструкції для застосування 20.12.2021.

Відповідальність за зміст інформації про медичний виріб несе Виробник.

Символи для маркування	Значення символу
	НОМЕР ЗА КАТАЛОГОМ
	ВИРОБНИК
	ВИКОРИСТАТИ ДО
	НОМЕР ПАРТІЇ
	Повторно використовувати ЗАБОРОНЕНО
	НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗНАК ВІДПОВІДНОСТІ
	ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ІНСТРУКЦІЯМИ ДЛЯ ЗАСТОСОВУВАННЯ
	ТЕМПЕРАТУРНЕ ОБМЕЖЕННЯ
	НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ, ЯКЩО УПАКОВКА ПОШКОДЖЕНА
	ОБЕРІГАТИ ВІД НАМОКАННЯ
	Не допускати впливу прямого сонячного світла